

## Kỹ thuật trồng ớt cay

Ớt cay chứa nhiều chất capsaicine có tác dụng gây cay, kích thích ngon miệng và thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hoá. Vì vậy, ớt cay đã trở thành cây gia vị được nhiều người ưa chuộng.

### 1. Thời vụ trồng ớt:

Ớt có thể trồng được 3 vụ trong năm:

- **Vụ sớm:** Gieo hạt tháng 8 - 9, trồng tháng 9 - 10, bắt đầu thu hoạch từ tháng 12 - 1 dl.

- **Vụ chính** (Đông Xuân): Gieo hạt tháng 10 - 11, trồng tháng 11-12, bắt đầu thu hoạch tháng 2-3 dl.

- **Vụ Hè Thu:** Gieo tháng 4-5 trồng tháng 5-6 thu hoạch 8-9 dl.

### 2. Giống:

Hiện nay có các loại giống sau: Giống ớt Sừng Trâu, Chỉ Thiên, ớt Búng, ớt Hiêm...

### 3. Chuẩn bị đất:

Cày xới phơi đất kỹ, lên luống cao 20 cm, rộng 1m. Bón lót: 100 kg vôi và 1 tấn phân chuồng, 50 kg super lân, 3 kg Kali, 2 kg Calcium nitrat, 10-15 kg phân NPK (16-16-8) cho 1.000 m<sup>2</sup>. Sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại, sâu bệnh, giảm hao hụt phân bón, nước tưới.

### 4. Gieo trồng:

Xử lý hạt ớt bằng nước ấm 3 sôi 2 lạnh (53<sup>0</sup>C) trong 30 phút, hong khô dưới ánh nắng mặt trời, gieo hạt vào bầu đã được xử lý thuốc để ngăn ngừa mầm bệnh, sâu hại tấn công. Khi cây có từ 4-5 lá thật (30-35 ngày sau gieo), thì chuyển cây con ra trồng.

Ớt có thể trồng theo nhiều khoảng cách khác nhau:

+ Khoảng cách trồng 50 x (30 - 40) cm.

+ Khoảng cách 70 x (50 - 60) cm.

### 5. Chăm sóc:

- **Tưới nước:** Sau khi trồng 3-5 ngày, tiến hành trồng dặm. Mùa mưa cần đảm bảo thoát nước tốt, mùa nắng phải tưới nước đầy đủ. Nếu khô hạn kéo dài thì tưới rãnh (tưới thấm) là phương pháp tốt nhất, khoảng 3-5 ngày tưới/lần. Tưới thấm vào rãnh tiết kiệm nước, không văng đất lên lá, giữ ẩm lâu, tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Mùa mưa cần chú ý thoát nước tốt, không để nước ứ đọng lâu.

- **Tỉa nhánh:** Tỉa bỏ các cành, lá dưới điểm phân cành để cây ớt phân tán rộng và gốc được thông thoáng. Nên tỉa cành lúc nắng ráo.

- **Làm giàn:** Giàn được làm bằng cây hay dây ni lông, giàn giữ cho cây đứng vững, dễ thu trái, kéo dài thời gian thu hoạch, hạn chế trái bị sâu bệnh do đổ ngã. Mỗi hàng ót cắm 2 trụ cây lớn ở 2 đầu, dùng dây căng dọc theo hàng ót nối với 2 trụ cây, khi cây ót cao tới đâu căng dây tới đó để giữ cây đứng thẳng.

- **Bón phân:** Phân nên chia làm 4 lần bón:

Lần 1: 20 - 25 ngày sau khi trồng: 4kg Urê + 3kg Kali + 10kg NPK (16-16-8) + 2kg Calcium nitrat.

Lần 2: Khi ót đã đậu trái đều: 6kg Urê + 5kg Kali + 10 - 15kg NPK (16-16-8) + 2kg Calcium nitrat.

Lần 3: Khi bắt đầu thu trái: 6kg Urê + 5kg Kali, 10 - 15kg NPK (16-16-8) + 3kg Calcium nitrat.

Lần 4: Khi thu hoạch rộ: 4kg Urê + 4kg Kali, 10-15kg NPK (16-16-8) + 3kg Calcium nitrat.

**Chú ý:** Trong giai đoạn nuôi quả, quả ót thường bị thối đuôi do thiếu canxi. Vì vậy, nhà nông cần phun bổ sung thêm Canxi, có thể bằng Clorua canxi ( $\text{CaCl}_2$ ) phun định kỳ 7-10 ngày/lần để ngừa quả bị thối đuôi. Đồng thời, phun thêm phân vi lượng có Bo để ót dễ đậu quả và phòng quả bị sọc.

## 6. Thu hoạch:

Thu hoạch ót khi quả bắt đầu chuyển màu. Ngắt cả cuống quả, tránh làm gãy nhánh. Ớt cay cho thu hoạch 35-40 ngày sau khi trở hoa, ở các lứa rộ thu hoạch ót mỗi ngày, bình thường cách 1-2 ngày thu 1 lần, nếu chăm sóc tốt thời gian thu hoạch có thể kéo dài hơn 2 tháng năng suất quả đạt 20-30 tấn/ha.

## 7. Một số sâu, bệnh thường gặp:

**Bọ trĩ:** Sống tập trung trong đọt non hay mặt dưới lá non, có thể dùng Regent, Confidor, Admire để phòng trị.

**Sâu xanh đục quả:** Sâu phồng cái búp non, nụ hoa, cắn điếm sinh trưởng, đục thủng quả, khi quả ót còn xanh cho đến lúc gần chín.

**Bọ phấn trắng:** Bọ chích hút làm lá biến vàng cây suy yếu, là tác nhân truyền virus từ cây bệnh sang cây khỏe. Có thể sử dụng ong ký sinh ngoài tự nhiên hoặc thuốc Admire, Confidor, phun ở mặt dưới lá để phòng trị.

**Sâu ăn tạp:** Sâu gây hại trên lá và cây con. Phòng trị bằng cách ngắt bỏ tổ trứng, tổ sâu non hoặc dùng: Sumicidin, Cymbus, Karate, Decis ... có thể pha trộn với Atabron., phun vào giai đoạn trứng sắp nở sẽ cho hiệu quả cao.

**Bệnh héo cây con:** Do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra. Bệnh thường gây hại cây con trong vườn ương hoặc sau khi trồng khoảng một tháng tuổi. Dùng Validacin, Anvil, Rovral, Ridomil; Copper -B, Tilt super, Bonanza để phòng trị.

**Bệnh héo chết cây:** Do vi khuẩn *Pseudomonas solanacearum*, nấm *Fusarium oxysporum*, *F. lycopersici*, *Sclerotium* sp. Cây bị bệnh héo vào buổi trưa, tươi lại vào buổi chiều, sau vài ngày cây bệnh chết hẳn. Đối với bệnh do vi khuẩn cần nhổ và tiêu hủy; dùng vôi bột rải vào đất, hoặc Starner, New Kasuran, Copper Zin C tưới nơi gốc cây hay phun ngừa bằng Kasumin. Đối với cây bệnh do nấm cần phát hiện sớm, phun ngừa hoặc trị bằng thuốc Copper B, Derosal, Appencarb super, Ridomil, Score.

**Bệnh thán thư:** Do nấm *Colletotrichum* sp gây ra. Bệnh gây hại trên lá, thân, hoa và cả quả. Bệnh lây lan mạnh vào mùa mưa, làm giảm năng suất trầm trọng. Có thể sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trị: Copper B, Manzate, Mancozeb, Antracol, Ridomil,...

*Trung tâm Khuyến nông TP.Cần Thơ*