

## **Ruồi đục lá hại đậu tương**

- Trưởng thành ruồi nhỏ, dài khoảng 2mm, màu đen. Ruồi đẻ trứng nhiều nhất vào buổi sáng và chiều mát, trứng rất nhỏ, được đẻ rải rác ở mặt trên lá.

- Sâu non dạng dòi, màu trắng sữa, đẩy sức dài khoảng 3mm. Sâu non sau khi nở đục dưới lớp biểu bì lá tạo thành các đường hầm ngoằn ngoèo màu trắng nhưng không làm thủng lá. Dòi phá hoại ngay từ khi cây mới có lá mầm cho đến khi cây có 3 lá thật, cây đậu lớn ít bị hại. Mật độ dòi cao làm phần lớn lá bị hại, cây đậu sinh trưởng kém.

- Hoá nhộng ở cuối đường đục trên lá hoặc ở dưới đất, nhộng màu nâu nhạt.

- Vòng đời trung bình 15-20 ngày, trong đó thời gian dòi 8-10 ngày.

### ***Phòng trừ***

- Luân canh đậu tương với lúa nước.

- Tỉa cây sớm, ngắt bỏ các lá, cây bị ruồi hại, vun gốc, chăm sóc cho cây đậu sinh trưởng tốt.

- Phun thuốc khi cây đậu non có triệu chứng bị hại, đối với ruồi đục thân nên phun thuốc khi cây đậu mới mọc có lá thật đầu tiên :

+ Ofunack 40 SP : 25-30 ml/bình 8 lít

+ Fastac 5 EC : 10-15 ml/bình 8 lít

+ Nurelle D 25/2.5 EC; Oncol 20 EC; Hopsan 75 EC : 25-30 ml/bình 8 lít

+ Oncol 25 WP : 20 g/bình 8 lít.

*Theo Báo Nông Nghiệp*