

Bọ xít hại lúa

* **Đặc điểm, tác hại:** Bọ xít hôi mình dài: Bọ non và bọ trưởng thành đều tập trung hút dịch trong hạt lúa đang ngâm sữa, làm cho hạt lửng hoặc đen lép. Mật độ bọ xít cao gây giảm năng suất rất lớn, có nơi không cho thu hoạch. Chúng gây hại lúa xuân muộn, ruộng lúa trở lê tè không tập trung, ruộng xen kẽ nơi đòi rùng hại nặng hơn.

* **Đặc điểm sinh học và qui luật phát triển:**

- Bọ xít có xu tính yếu đối với ánh sáng, ưa mùi hôi tanh.
- Trưởng thành hoạt động mạnh vào sáng, lúc trời râm mát, đẻ trứng trên hai mặt lá lúa, bẹ lá.
- Trứng màu đỏ nâu, đẻ thành hàng dọc theo gân lá.
- Thời gian trứng 6-7 ngày; bọ xít non 17-25 ngày; trưởng thành sống 6-15 ngày.

* **Biện pháp phòng trừ:**

- Gieo cây tập trung để lúa trở đều giảm bớt tác hại.
- Sử dụng một số tác nhân dẫn dụ bọ xít tập trung để dễ tiêu diệt như: Dùng lá xoan ngâm nước giải hoặc ngâm trong nước cá giã nhỏ cho thêm mẻ chua rồi cắm quanh bờ ruộng. Khi bọ xít tập trung với mật độ cao trong diện tích hẹp, sử dụng một trong các loại thuốc sau pha với 20 lít nước phun cho 1 sào (phun vào buổi chiều):
 - + Karate 2,5EC, lượng thuốc dùng 15-20 cc.
 - + Fastac 5 EC, lượng thuốc dùng 15-20 cc.
 - + Bi58 50EC, lượng thuốc dùng 40-50 cc.
- Dùng vải thô may thành vợt, vợt bắt bọ xít vào buổi sáng sớm và lúc chiều tà.

Nguồn: Sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ)