

## Kỹ thuật trồng cây táo

Táo ta là loại cây trồng thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau, sau một năm bắt đầu cho thu hoạch, năng suất cao và ổn định.

### Các giống táo chính ở nước ta

**Táo thiện phiên:** ra hoa rải rác từ cuối tháng 5 nhưng lứa hoa vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 mới đậu quả, chín sau tết nguyên đán, quả tròn hơi dẹt, khi chín có màu vàng trắng, vỏ hơi nứt thành vệt li ti.

**Táo gia lộc:** quả hình trái xoan khi chín có màu vàng tươi, vị hơi chua, trọng lượng quả 20-25g, vụ chính ra hoa vào tháng 7,8,9, thu hoạch vào tháng 11,12.

**Táo số 12:** ra hoa rải rác từ tháng 5, nở rộ và đậu quả vào tháng 9, chín vào tháng 1,2, quả tròn hơi dài khi chín có màu vàng nhạt, vị ngọt đậm và thơm.

**Táo số 32:** quả tròn, chín có màu vàng tươi, vị ngọt hơi chua, có mùi thơm, ra hoa vào tháng 8,9, thu hoạch tháng 1,2, trọng lượng quả trung bình 20g.

**Táo đào tiên:** ra hoa rải rác từ tháng 5 hoa nở rộ và kết trái vào tháng 9, quả tròn, khi chín có vị ngọt, giòn.

**Táo chua:** chín vào tháng 3, quả nhỏ, mã đẹp.

**Nhân giống:** chủ yếu là ghép mắt, ghép theo kiểu chữ T hoặc cửa sổ, thời vụ ghép tốt nhất là vụ thu tháng 7,8,9. Sử dụng các giống táo chua làm gốc ghép.

### Trồng và chăm sóc:

**Thời vụ:** trồng vào vụ xuân.

**Cách trồng:** khoảng cách cây cách cây từ 4 – 5m, hàng cách hàng 5 – 6m, đào hố sâu 40cm, rộng 60 – 80cm, bón 30 – 40kg phân chuồng, 0,5kg vôi bột, 1kg lân trộn đều với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố, lấp hố trước trồng 1 tháng. Sau trồng cần chú ý phủ gốc và vật bở mầm dại, làm cỏ.

**Bón phân:** khi cây còn nhỏ bón: 20 – 30kg phân chuồng, 2kg đạm, 1kg lân, 1kg kali/gốc. Khi cây đã cho sản lượng ổn định bón 30 – 40kg phân chuồng, 4kg đạm, 2kg lân, 1kg kali/gốc/năm.

### Phòng trừ sâu bệnh:

Sâu cắn lá, sâu cuốn lá, nhện đỏ phá hoại chủ yếu vào mùa hè dùng Dipterec 0,1% phun định kỳ 15 ngày/lần.

Phòng trừ bệnh phấn trắng thối quả bằng cách tỉa thoáng và phun Boóc Đô 1% hoặc Zineb 0,5 – 1%.

**Đốn táo:** thường áp dụng 2 hình thức sau:

**Đốn phớt:** hàng năm sau thu hái quả thì tiến hành đốn phớt nhằm giữ cho năng suất cao và ổn định bằng cách cắt toàn bộ cành quả và cành mẹ (kỹ thuật này áp dụng với táo gia lộc làm trái vụ).

**Đốn đau:** áp dụng cho đốn tạo hình cho cây con và cây đã già để tạo cho cây có bộ khung tán mới bằng cách cắt cụt hết các cành chỉ để lại 3 – 5 cành chính.

**Thời vụ đốn:** tốt nhất vào 15/2 – 15/3, sau đốn cần bón bổ sung phân chuồng và phân vô cơ.

*Theo Agriviet.com*