

# Kỹ thuật trồng và công dụng cây quế

## 1. Giống:

Quả chín tháng 1 – 2, quả chín sớm hơn vào tháng 12-1. Thu hái quả khi quả chuyển sang màu tím, thịt quả xốp có mùi thơm.

Quả sau khi thu hái ủ thành đống 2-3 ngày cho chín đều, khi quả chín đem ngâm vào nước sạch từ 12 - 16 giờ, sau đó thu hạt, hong khô nơi râm mát cho hạt ráo nước. Khoảng 2 - 2,5 kg quả được 1 kg hạt.



Hạt mới có khoảng 3.000 - 5.000 hạt/kg với tỷ lệ nảy mầm > 95%.

Hạt được trộn với cát ẩm đánh thành luống đưa vào bảo quản ở chỗ râm mát. Thời hạn bảo quản ngắn, chỉ trong 1-2 tháng.

Trước khi gieo ngâm hạt trong nước 40°C trong 8 giờ. Hạt nảy mầm nhanh trong 7 - 20 ngày.

## 2. Kỹ thuật trồng:

Thích hợp nơi có nhiệt độ trung bình 22 – 26°C, lượng mưa 2.000mm.

Độ cao tuyệt đối 200 - 300m đến 600 - 700m.

Độ dốc dưới 15 – 20°C.

Đất sâu dày, ẩm, thành phần cơ giới trung bình, độ phì còn khá, thoát nước, pH: 4-5

Trồng tập trung và phân tán. Hạt giống nhiều, thu hái ở rừng giống chuyển hoá.

Trồng theo tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật trồng bằng cây con có bầu, tỉa thưa và khai thác rừng quế.

## 3. Công dụng:

Vỏ và tinh dầu quế dùng làm thuốc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, có giá trị xuất khẩu cao.

Gỗ dùng làm nhà, đóng đồ dùng, nguyên liệu giấy dăm.

*Theo dof.mard.gov.vn*