

Cách ra bầu cây con đạt tỷ lệ sống cao

Hạt giống được gieo trong cát nhỏ (loại cát trát tường nhà), gieo dày như gieo mạ, lấp lớp cát nhỏ lên trên hạt khoảng 1-2 cm tùy từng loại hạt. Ví dụ hạt các loại rau, hạt cây có vỏ mỏng, mềm lấp mỏng; hạt cây ăn quả, cây lâm nghiệp, hạt có vỏ dày cứng lấp sâu. Tốt nhất các loại hạt đem ngâm đủ nước, nếu mùa lạnh đem ủ ấm đến nứt nanh 20-30% đem gieo.

Mùa đông giá lạnh cần che kín hạt gieo bằng nilon màu trắng khi nhiệt độ ngoài trời 15°C, hạt sẽ nhanh nảy mầm.

Khi cây con có 1-2 lá mầm đến 1 lá thật ra bầu là tốt nhất, vì giai đoạn này cây con mới hút nước, chưa hút phân từ đất (dinh dưỡng sử dụng dự trữ trong lá mầm đến khi có 3 lá thật), bộ rễ chưa phát triển nên ít bị tổn thương.

Giá thể trong bầu tốt nhất là dùng đất bùn ao, phù sa phơi ải 50% + 50% phân chuồng ủ hoai mục (phân chất đống, ủ kín khoảng 2 tháng, toi xối không có mùi hôi thối).

Khi ra bầu cây con, cần cung cấp đủ ẩm, ngày tưới 2 lần bằng thùng loa. Năng to cần che bớt ánh sáng trực tiếp bằng lưới đen tản nhiệt trong 7-10 ngày liền. Trời rét nhiệt độ thấp dưới 13°C cần che kín bằng nilon màu trắng.

Trong vườn ươm nếu tưới nhiều nước, nên độ ẩm không khí cao, thường hay bị nấm bệnh lở cổ rễ làm chết cây con.

Cách phòng trừ: Phun phòng khi chưa bị bệnh 7-10 ngày/lần bằng thuốc nội hấp Carbenzim 50WP hoặc Anvil 5EC nồng độ 0,3%. Nếu bệnh xuất hiện, phun phối hợp một trong hai loại thuốc trên với thuốc tác dụng tiếp xúc Validamicin 5L hoặc Daconil 40WP.

Theo *Nông nghiệp Việt Nam*